

Associação de protocolos

Após a pausa de 24 horas da aplicação com Intradermoterapia pressurizada, temos a opção de intercalar o protocolo com sessões de drenagem linfática, massagem modeladora ou qualquer outro tipo de massagem para ativar a circulação e oxigenar os tecidos.

Microcorrentes podem ser utilizadas, uso de ultrassom ou endermologia após o tempo de 24 horas.

O uso do eletrocautério ou jato de plasma em arraste é permitido, mas a cauterização somente após a cicatrização do local lesionado com a pressurizada.

Microagulhamento pode ser aplicado somente quando os pontos da cauterizadas estiverem completamente cicatrizados, para não correr o risco de infecção ou inflamação na pele.

O uso de radiofrequência ou crio frequência é recomendável após 72 horas, pois pode causar manchas devido a alta temperatura.

Para a aplicação de radiofrequência ou crio frequência antes da pressurizada não é recomendável, pois ocorre o efeito de vasodilatação aumentando o fluxo sanguíneo.

Não aplicar em pessoas com botox ou preenchimento recente, procure aguardar próximo ao tempo de validade desses procedimentos, pois a pressurizada pode diminuir a eficácia.

O uso de led é bem vindo logo após intradermoterapia pressurizada para promover uma boa cicatrização tecidual.

A(o) profissional de estética pode perfeitamente intercalar os procedimentos para melhores resultados.